

## INFORME DE ECOGRAFÍA ABDOMINAL

Clinica Veterinaria: ECOPSET	Edad: 10 años
Médico solicitante: DR. OSCAR REYES	Sexo: MACHO ENTERO
Paciente: Fernet Quintana	Peso: aprox <10KG
Especie: canino	Ayunas: si
Raza: Bulldog F	Fecha: 09/07/25
Motivo del examen: énfasis aparato digestivo, páncreas e intestino.	

<b>1. VEJIGA</b>		<b>5. BAZO</b>	
<p>Forma: normal          Contenido: moderado, anecoico          Paredes: dorsal 0.28 cm; ventral 0.20 cm          Mucosa: regular          Sedimento: ausente          Se evidencia muy pequeña dilatación de aspecto quístico (contenido anecoico) en porción distal del cuello vesical, en el lado derecho, a nivel de trigono vesical.</p>		<p>Tamaño: <b>levemente aumentado</b>          Grosor: <b>1.62 cm, levemente engrosado</b>          Ecotextura: <b>sutilmente heterogénea</b>          Ecogenicidad: normal          Bordes: lisos y regulares          Vasculatura: normal          Se evidencia pequeño foco redondeado hipoeicoico en cabeza de bazo, de 0.35x0.46cm.</p>	
<b>2. RIÑÓN</b>	<b>DERECHO</b>	<b>IZQUIERDO</b>	<b>6. ESTÓMAGO</b>
Tamaño:	5.60x2.94x2.81cm normal	5.61x2.87x2.87cm normal	Espesor: 0.35 cm Mucosa: regular
Definición:	<b>Leve reducción</b>	<b>Leve reducción</b>	Estratificación: normal
Ecotextura:	homogéneo	homogéneo	Contenido: <b>moderado gas</b>
Ecogenicidad:	normal	normal	Peristaltismo: normal
Bordes:	lisos y regulares	lisos y regulares	La cantidad de gas permitió evaluar el contenido y las paredes de forma parcial.
Pelvis:	normal	normal	
<b>3. HÍGADO</b>		<b>7. INTESTINO (yeyuno e íleon)</b>	
<p>Tamaño: normal          Bordes: lisos y cortantes          Ecotextura: homogénea          Ecogenicidad: <b>leve disminución</b>          Vasculatura: normal</p>		<p>Espesor: 0.37cm          Estratificación: normal          Contenido: moderado mucus          Serosa: normal          Trayecto: normal          Peristaltismo: normal          Duodeno descendente proximal de 0.48 cm.</p>	
<b>4. VESÍCULA</b>		<b>8. COLON (descendente)</b>	
<p>Forma: normal          Contenido: moderado, anecoico          Paredes: 0.11 cm          Barro: <b>abundante</b>          Volumen: 15.03 ml</p>		<p>Espesor: 0.14 cm          Estratificación: normal          Contenido: escaso, ecogénico, hipereicoico.          Compatible con heces pastosas y gas          Peristaltismo: normal</p>	
<b>9. LÍQUIDO LIBRE</b>			
Cantidad: ausente			

**10. ADRENALES**

**DERECHA**

Tamaño: normal  
 0.57 cm caudal, 0.45 cm craneal, 2.47 cm largo  
 Forma: normal  
 Contornos: regulares  
 Ecotextura: homogénea  
 Ecogenicidad: hipoecóica  
 Definición C/M: evidente

**IZQUIERDA**

Tamaño: engrosado  
 0.70cm caudal engrosado, 0.89cm craneal engrosado semi redondeado y heterogéneo, 2.89cm largo  
 Forma: normal  
 Contornos: regulares  
 Ecotextura: homogénea  
 Ecogenicidad: hipoecóica  
 Definición C/M: evidente

**11. RAMA PANCREÁTICA DERECHA.** No descarta pancreatitis. Solo el 60% de las pancreatitis se pueden diagnosticar con ecografía. Se sugiere correlacionar con sintomatología de paciente.

Tamaño: 1.26 cm, leve aumento  
 Ecogenicidad: levemente aumentada, con grasa peri pancreática levemente hiperecoica  
 Ecotextura: homogénea  
 Vasculatura: normal

**12. PROSTATA**

Tamaño: aumentado  
 2.45 cm de alto, 4.15 cm de ancho y 3.63 cm de largo  
 Forma: simétrica  
 Ecogenicidad: ecogénica  
 Ecotextura: heterogénea  
 Presenta pequeño foco anecoico en su aspecto derecho de 0.39x0.63 cm

**13. TESTÍCULOS.**

**DERECHO**

Tamaño: 2.87x1.95 cm, normal  
 Ubicación: saco escrotal  
 Ecogenicidad: intermedia  
 Arquitectura: conservada  
 Epidídimo: conservado  
 Presenta pequeño foco hipoecoico y heterogéneo, de 0.83x1.27 cm.

**IZQUIERDO**

Tamaño: 2.92x2.07 cm, normal  
 Ubicación: saco escrotal  
 Ecogenicidad: intermedia  
 Arquitectura: conservada  
 Epidídimo: conservado

**ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS SUGERIDOS**

Hemograma, perfil hepático, pancreático (lipasa pancreática específica canina), renal, densidad urinaria, análisis de orina, ratio proteína en orina/creatinina, SDMA, según signos clínicos y a manera de control.

**OBSERVACIONES:**

Paciente de temperamento poco nervioso.  
 Se sugiere seguimiento clínico y re evaluación ecográfica según sintomatología.

**EN SUMA, IMÁGENES COMPATIBLES CON:**

- **Imagen vesical evidencia pequeña dilatación en lado derecho del trigono vesical sugerente de posible ureterocele unilateral derecho.** No se evidenció recorrido craneal del uréter debido a marcada tensión abdominal por parte del paciente y moderado contenido fecal. Se recomienda ante nuevo estudio ecográfico considerar ayuno de al menos 12hrs, y se prefiere evacuación previa. Relacionar con signos clínicos y uroanálisis, se sugiere complementar con urografía excretora.
- **Imagen renal evidenció leve reducción de la diferenciación cortico medular.** Dicho cambio degenerativo senil no determina función actual. Relacionar con pruebas de función renal.
- **Imagen hepática evidenció leve disminución de ecogenicidad, sugiere posible proceso inflamatorio en curso / origen metabólico / tóxico / infeccioso, entre otros.** Relacionar con pruebas de función hepática.
- **Imagen de vesícula biliar evidenció abundante cantidad de barro, sugiere posible hiperplasia de pared o inflamación en curso.** Se sugiere monitoreo.
- **Imagen gástrica evidenció moderado contenido de patrón gaseoso.**
- **Imagen esplénica evidenció esplenomegalia leve y parénquima levemente heterogéneo, y presencia de pequeño foco hipocóico sugerente de nódulo hiperplásico / infiltrativo.** Este hallazgo es observado en procesos inflamatorios / hematopoyesis extramedular / hiperplasia linfóide, otros. Relacionar con hemograma.
- **Imagen de glándula adrenal izquierda evidencia adrenomegalia unilateral leve, asociado a posible hiperplasia adrenal.** Relacionar con signos clínicos, se sugiere monitoreo ecográfico y evaluación endocrina integral.
- **Imagen pancreática evidenció aumento leve del tamaño y ecogenicidad, sugiere posible pancreatopatía antigua / crónica / infiltrado graso.** Relacionar con pruebas de función pancreática.
- **Imagen prostática sugerente de hiperplasia prostática moderada, con pequeño foco hipocóico sugerente de quiste en parénquima.** Se sugiere monitoreo ecográfico.
- **Imagen testicular derecha evidencia pequeño foco hipocóico sugerente de nódulo hiperplásico / infiltrativo.**

*\*La ecografía es un método diagnóstico complementario que no determina función, ni tipo celular de los órganos evaluados. Es necesario presenciar las imágenes ecográficas en movimiento para emitir un diagnóstico, las fotos son referenciales. El diagnóstico ecográfico debe ser interpretado por el médico solicitante según los signos clínicos del paciente.*



**Cristel Tello Ortiz**  
Médico Veterinario Zootecnista  
*Diplomado en Ecografía Veterinaria*  
CMVP 8960















































