

INFORME DE ECOGRAFÍA ABDOMINAL

Clínica Veterinaria: Ecospet	Edad: 6 años
Médico solicitante: Miluska Muñiz	Sexo: hembra entera
Paciente: Ginebra Cerruti	Peso: 6.7 kg
Especie: canino	Ayunas: si
Raza: mestizo	Fecha: 19/06/25
Motivo del examen: chequeo anual.	

1. VEJIGA...		5. BAZO	
Forma: normal Contenido: escaso, anecoico Paredes: 0.40 cm, levemente engrosada. Se sugiere evaluar en repleción moderada Mucosa: regular Sedimento: ausente		Tamaño: normal Grosor: 1.20 cm Ecotextura: homogénea Ecogenicidad: normal Bordes: lisos y regulares Vasculatura: normal	
2. RIÑÓN	DERECHO	IZQUIERDO	6. ESTÓMAGO
Tamaño:	4.16x2.08x2.26cm normal	4.32x2.31x2.52cm normal	Espesor: 0.35 cm, normal Mucosa: regular Estratificación: normal Contenido: escaso, ecogénico, hiperecoico, compatible con mucus y gas Peristaltismo: normal La cantidad de gas permitió evaluar el contenido y las paredes de forma parcial.
Definición	levemente disminuida	levemente disminuida	
Ecotextura:	homogéneo	homogéneo	
Ecogenicidad:	levemente aumentada	levemente aumentada	
Bordes:	lisos y regulares	lisos y regulares	
Pelvis:	normal	normal	
3. HÍGADO		7. INTESTINO (yeyuno)	
Tamaño: lóbulo caudado levemente disminuido Bordes: lisos y cortantes Ecotextura: homogénea Ecogenicidad: normal Vasculatura: normal Tronco de vena Porta: 0.41 cm		Espesor: 0.27 cm, normales Estratificación: normal Contenido: escaso, ecogénico, hiperecoico, compatible con mucus y gas Serosa: normal Trayecto: normal Peristaltismo: normal Duodeno: descendente proximal de 0.34 cm, normal.	
4. VESÍCULA		8. COLON (descendente)	
Forma: normal Contenido: moderado, anecoico Paredes: normales Barro: ausente		Espesor: 0.16 cm, normal Estratificación: normal Contenido: escaso a moderado, ecogénico, hiperecoico, compatible con heces semipastosas Peristaltismo: normal	
9. LÍQUIDO LIBRE			
Cantidad: ausente			

10. ADRENALES simétricas.

DERECHA

Tamaño: normal

1.73 cm largo, 0.45 cm caudal

Forma: normal

Contornos: regulares

Ecotextura: homogénea

Ecogenicidad: hipoecóica

Definición C/M: no se observa

IZQUIERDA

Tamaño: normal

1.89 cm largo, 0.42 cm caudal

Forma: normal

Contornos: regulares

Ecotextura: homogénea

Ecogenicidad: hipoecóica

Definición C/M: no se observa

11. RAMA PANCREÁTICA DERECHA

DERECHA

Tamaño: 0.78 cm, normal

Ecogenicidad: levemente aumentada

Ecotextura: heterogénea

Bordes: regulares y definidos

Vena pancreática: normal

IZQUIERDA

Topografía conservada.

12. OVARIOS simétricos.

DERECHO

Tamaño: 1.39x0.54 cm, normal

Ecogenicidad: hipoecóico

Ecotextura: homogénea

IZQUIERDO

Tamaño: 1.28x0.61 cm, normal

Ecogenicidad: hipoecóico

Ecotextura: homogénea

13. ÚTERO

CUPERO DE ÚTERO hipoecoico, homogéneo, de cm de diámetro.

CUERNOS UTERINOS simétricos.

DERECHO

Tamaño: 0.51 cm, normal

Ecogenicidad: hipoecóico

Ecotextura: homogénea

Contenido: ausente

IZQUIERDO

Tamaño: 0.53 cm, normal

Ecogenicidad: hipoecóico

Ecotextura: homogénea

Contenido: muy escaso e hipoecóico

Pared: 0.15cm, normal

...CONTINÚA

VEJIGA presenta en trígono vesical, estructura tubular anecóica con paredes finas ecogénicas. En su porción más distal se distiende de forma focal, aumentando y disminuyendo de tamaño hasta 0.71cm aprox. Sugerente de hidroureter, ureterocele, aparentemente de lado derecho.

OTROS:

No se encontraron masas en cavidad abdominal.

Otros órganos evaluados no mostraron anormalidades.

**Topografía: se refiere únicamente a la zona donde debería estar ubicado el órgano y no al órgano en sí.*

ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS SUGERIDOS

Hemograma, perfil hepático, pancreático (lipasa pancreática específica canina), renal, densidad urinaria, análisis de orina, ratio proteína en orina/creatinina, SDMA, ecografía abdominal en ayunas, según signos clínicos y a manera de control.

OBSERVACIONES:

Se sugiere seguimiento clínico y re evaluación ecográfica según sintomatología.

EN SUMA, IMÁGENES COMPATIBLES CON:

- **Vejiga** levemente engrosada. Sugerente de cistitis. Asociar a grado de repleción, urianálisis y signos clínicos.
- **Trígono vesical**, presenta uréter derecho distal distendido con motilidad conservada. Sugerente de hidroureter, ureteroceles. Se sugiere seguimiento y asociar a signos clínicos.
- **Riñones** con cambios sugerentes de infiltración grasa, glomerulopatía, inflamación/patología difusa. Asociar a función y signos clínicos.
- **Hígado** con lóbulo caudado disminuido de tamaño sugerente de hepatopatía crónica. Asociar a función, antecedentes y signos clínicos.
- **Páncreas, rama pancreática derecha** con cambios sugerentes de infiltración grasa, fibrosis, inflamación. Considerar pancreatitis crónica. Asociar a función y signos clínicos.

**La ecografía es un método diagnóstico complementario que no determina función, ni tipo celular de los órganos evaluados. Es necesario presenciar las imágenes ecográficas en movimiento para emitir un diagnóstico, las fotos son referenciales. El diagnóstico ecográfico debe ser interpretado por el médico solicitante según los signos clínicos del paciente.*



Joanna Flores Ramírez
Médico Veterinaria Zootecnista
Posgrado en Ecografía Veterinaria
CMVP 7203



























