

## INFORME DE ECOGRAFÍA ABDOMINAL

Clínica Veterinaria: Ecospet	Edad: 9 años
Médico solicitante: Oscar Reyes	Sexo: macho castrado
Paciente: Rocky Florian	Peso: 12kg
Especie: canino	Ayunas: si
Raza: Schanauzer	Fecha: 01/03/25
Motivo del examen: antecedentes de cálculos.	

<b>1. VEJIGA</b>			<b>5. BAZO</b>		
<b>Forma:</b> normal <b>Contenido:</b> abundante, anecoico <b>Paredes:</b> <0.1cm, normal <b>Mucosa:</b> regular <b>Sedimento:</b> ausente			<b>Tamaño:</b> normal <b>Grosor:</b> 1.27cm, normal <b>Ecotextura:</b> homogénea <b>Ecogenicidad:</b> normal <b>Bordes:</b> lisos y regulares <b>Vasculatura:</b> normal		
<b>2. RIÑÓN</b>	<b>DERECHO</b>	<b>IZQUIERDO</b>	<b>6. ESTÓMAGO</b>		
<b>Tamaño:</b>	4.77x2.44x2.60cm normal	5.04x2.64x3.01cm normal	<b>Espesor:</b> 0.27cm, normal		
<b>Definición</b>	levemente disminuida	levemente disminuida	<b>Mucosa:</b> regular		
<b>Ecotextura:</b>	homogéneo	homogéneo	<b>Estratificación:</b> normal		
<b>Ecogenicidad:</b>	normal	normal	<b>Contenido:</b> ecogénico, hiperecoico. Compatible con moderada cantidad de gas		
<b>Bordes:</b>	lisos y regulares	lisos y regulares	<b>Peristaltismo:</b> normal		
<b>Pelvis:</b>	normal	normal	La cantidad de gas permitió evaluar el contenido y las paredes de forma parcial.		
<b>3. HÍGADO</b>			<b>7. INTESTINO (yeyuno)</b>		
<b>Tamaño:</b> normal <b>Bordes:</b> lisos y cortantes <b>Ecotextura:</b> homogénea <b>Ecogenicidad:</b> levemente aumentada <b>Vasculatura:</b> normal			<b>Espesor:</b> 0.24cm, normales <b>Estratificación:</b> normal <b>Contenido:</b> ecogénico, hiperecoico. Compatible con escaso mucus y moderada cantidad de gas <b>Serosa:</b> normal <b>Trayecto:</b> normal <b>Peristaltismo:</b> normal <u>Duodeno:</u> descendente proximal de 0.36cm, normal.		
<b>4. VESÍCULA</b>			<b>8. COLON (descendente)</b>		
<b>Forma:</b> normal <b>Contenido:</b> moderado, anecoico <b>Paredes:</b> normales <b>Barro:</b> ausente			<b>Espesor:</b> 0.14cm, normales <b>Estratificación:</b> normal <b>Contenido:</b> escaso a moderado, ecogénico, hiperecoico. Compatible con heces semi pastosas a compactas y gas <b>Peristaltismo:</b> normal		
<b>9. LÍQUIDO LIBRE</b>					
Cantidad: ausente					

#### 10. ADRENALES simétricas

##### DERECHA

**Tamaño:** normal

1.43cm largo, 0.40cm caudal, cm craneal

**Forma:** normal

**Contornos:** regulares

**Ecotextura:** homogénea

**Ecogenicidad:** hipoecóica

**Definición C/M:** no se observa

##### IZQUIERDA

**Tamaño:** normal

2.00m largo, 0.39cm caudal

**Forma:** normal

**Contornos:** regulares

**Ecotextura:** homogénea

**Ecogenicidad:** hipoecóica

**Definición C/M:** si se observa

#### 11. RAMA PANCREÁTICA DERECHA

**Tamaño:** 0.77 a 0.92cm, normal

**Ecogenicidad:** levemente aumentada

**Ecotextura:** heterogénea

**Vena pancreática:** normal

#### 12. PROSTATA

**Tamaño:** normal post castración

1.96cm de alto, 1.79cm de ancho y 2.86cm de largo

**Forma:** simétrica

**Ecogenicidad:** hipoecóica

**Ecotextura:** levemente heterogénea

*\*Topografía: se refiere únicamente a la zona donde debería estar ubicado el órgano y no al órgano en sí.*

#### 14. LINFONODOS

**TOPOGRAFÍA DE HIPOGÁSTRICOS E ILIACOS MEDIALES** conservada.

##### OTROS:

Moderada cantidad de tejido adiposo en cavidad abdominal.

No se encontraron masas en cavidad abdominal.

Otros órganos evaluados no mostraron anormalidades.

#### ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS SUGERIDOS

Hemograma, perfil hepático, pancreático (lipasa pancreática específica canina), renal, densidad urinaria, análisis de orina, ratio proteína en orina/creatinina, SDMA, ecografía abdominal ***en ayunas***, según signos clínicos y a manera de control.

##### OBSERVACIONES:

Paciente de temperamento nervioso, dificultó evaluación ecográfica.

Se sugiere seguimiento clínico y re evaluación ecográfica según sintomatología.

**EN SUMA, IMÁGENES COMPATIBLES CON:**

- **Riñones** con la definición levemente disminuida sugerentes de inflamación/patología difusa, Asociar a función y signos clínicos.
- **Hígado** con ecogenicidad aumentada, sugerente de hepatitis crónica (colestasis crónica), algún grado de fibrosis, hepatopatía vacuolar esteroidea (altas concentraciones de corticosteroides en plasma, medicamentos, endocrinopatías), esteatosis o lipidosis, hepatopatía infecciosa (Leptospira, Ehrlichia, Leishmania, Adenovirus), inmunomediada, idiopática. Asociar a función y signos clínicos.
- **Rama pancreática derecha** con cambios sugerentes de inflamación, pancreatitis crónica, infiltración grasa, fibrosis, cambios seniles. Asociar a función y signos clínicos.

*\*La ecografía es un método diagnóstico complementario que no determina función, ni tipo celular de los órganos evaluados. Es necesario presenciar las imágenes ecográficas en movimiento para emitir un diagnóstico, las fotos son referenciales. El diagnóstico ecográfico debe ser interpretado por el médico solicitante según los signos clínicos del paciente.*



**Joanna Flores Ramírez**  
Médico Veterinaria Zootecnista  
Posgrado en Ecografía Veterinaria  
CMVP 7203



















